

LAGARTIJA ESBELTA

(*Liolaemus tenuis*)

Mide alrededor de 14 cm (las hembras unos 12 cm), de los cuales sólo 6 cm corresponden al largo del cuerpo (del hocico a la abertura cloacal).

Posee escamas dorsales de tamaño pequeño, redondeadas e imbricadas. Presenta un visible dimorfismo sexual; el macho, el cual es muy territorial, posee una coloración base dorsal verde oscura, la cual contiene vivas e intensas máculas amarillo-verdosas en la zona anterior del dorso, y manchas azules, celestes y turquesas en el área posterior.



La hembra posee una cabeza más pequeña que el macho y una coloración bastante más apagada. Es de coloración grisácea, con escamas verde-amarillentas y celestes distribuidas aleatoriamente, y pequeñas barras transversales negras separadas a lo largo de la línea vertebral.



Alimentación: Insectos. Biología: Árboles, rocas, murallas.

Distribución geográfica: Desde la región de Coquimbo hasta Los Lagos.

La cola es equivalente a 1,5 la longitud cabeza-tronco. El dorso gris con barritas negras transversales que no llegan hasta la línea media y que en los flancos se unen entre sí. Dichas barritas están ribeteadas de café oscuro. El vientre es grisáceo blanquecino. La cola y extremidades son grises plumizas, con pequeñas rayas negras y escasos puntos verdosos.



Te invitamos a conocer nuestra Ruta Patrimonial Fray Jorge Reserva de la Biósfera, para más información visita rutas.bienes.cl y síguenos en nuestras redes sociales. Puedes acceder a ellas directamente escaneando este código QR.